

Культура	Ожидаемый результат	Норма расхода препарата	Расход рабочей жидкости	Максимальная кратность обработок	Сроки ожидания, дни	Способ обработки
Арбуз, дыня	Повышение урожайности, качества продукции, улучшение сопротивляемости неблагоприятным факторам	1,0-2,0	200-400	-	-	Некорневая подкормка 2-4 раза в течение сезона: при высоте растений 10 см или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов
		2,0-5,0	В зависимости от системы полива	-	-	Корневая подкормка 2-4 раза в течение сезона: при высоте растений 10 см или при высадке рассады, перед цветением, в начале образования плодов
2,0-4,0		800-1000	-	-	Некорневая подкормка 2-3 раза в течение сезона: перед цветением, в фазе окончания цветения - начала образования ягод, во время созревания при изменении цвета ягод	
1,0-2,0		200-400	-	-	Некорневая подкормка 2-3 раза в течение сезона: после высадки рассады, далее - с интервалом 20 дней	
1,0-2,0		200-400	-	-	Некорневая подкормка 2-3 раза в течение сезона: при высоте растений 15 см, в начале клубнеобразования, через 15 дней после последней подкормки	
Лук, чеснок		1,0-2,0	200-400	-	-	Некорневая подкормка 1-3 раза в течение сезона: в период образования 4-5 листьев (в начале формирования луковицы), далее - с интервалом 20 дней
		2,0-5,0	В зависимости от системы полива	-	-	Корневая подкормка 1-3 раза в течение сезона: период образования 4-5 листьев (в начале формирования луковицы), далее - с интервалом 20 дней
Плодовые культуры (яблоня, груша и т.д.)		2,0-4,0	800-1000	-	-	Некорневая подкормка 2-4 раза в течение сезона: перед цветением, в период окончания цветения - начала образования плодов, в фазе плода размером с орех, в фазе плода 6-7 см
Свекла кормовая, сахарная, столовая; турнепс, морковь		3,0-4,0	200-400	-	-	Некорневая подкормка 2-4 раза в течение сезона: в период образования 3-4 настоящих листьев, далее - с интервалом 20 дней
Томат, баклажан, перец		1,0-2,0	200-400	-	-	Некорневая подкормка 2-4 раза в течение сезона: при высоте растений 10 см или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов, при изменении цвета плодов во время созревания
	2,0-5,0	В зависимости от системы полива	-	-	Корневая подкормка 2-4 раза в течение сезона: при высоте растений 10 см или при высадке рассады, перед цветением, в начале образования плодов, при изменении цвета плодов во время созревания	
Цветочно-декоративные культуры	1,0-2,0	200-1000	-	-	Некорневая подкормка 2-4 раза в течение сезона: весной в начале возобновления вегетации (для многолетних растений) или при высоте растений 10 см или после высадки рассады (для однолетних растений) далее - с интервалом 15 дней	
	2,5	В зависимости от системы полива	-	-	Корневая подкормка 2-4 раза в течение сезона: весной в начале вегетации (для многолетних растений) или при высоте растений 10 см или после высадки рассады (для однолетних растений), далее - с интервалом 15 дней	