

Культура	Вредитель, болезнь, сорняк	Норма расхода препарата	Расход рабочей жидкости	Максимальная кратность обработок	Сроки ожидания, дни	Способ обработки
<b>Персик, абрикос, слива, вишня, черешня</b>	<b>Клястероспориоз, курчавость листьев, коккомикоз</b>	0,2 л/га	до 1000 л/га	2	21	Опрыскивание в период вегетации: первое — в фазе «зеленый конус», второе — после цветения.
<b>Персик, абрикос, слива</b>	Клястероспориоз, курчавость листьев	2 мл/10 л воды (для ЛПХ)	2–5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта)	2	21	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней.
<b>Виноград</b>	<b>Оидиум, черная пятнистость, краснуха, черная гниль</b>	0,3–0,4 л/га	до 1000 л/га	4	10	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка — весной в фазе бутонизация—цветение, вторая — до смыкания ягод в грозди, дальнейшие обработки с интервалом 10–14 дней.
<b>Вишня, черешня</b>	<b>Коккомикоз</b>	2 мл/10 л воды (для ЛПХ)	2–5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта)	2	21	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней.
<b>Яблоня, груша</b>	<b>Парша, мучнистая роса</b>	0,15–0,2 л/га	до 1000 л/га	3	20	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней.

		2 мл/10 л воды (для ЛПХ)	2–5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта)	3	20	Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней.
<b>Декоративные растения</b>	<b>Мучнистая роса</b>	2 мл/10 л воды (для ЛПХ)	10 л/100 м <sup>2</sup>	2	-	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие — с интервалом 14 дней.
	<b>Пятнистости</b>	5 мл/10 л воды (для ЛПХ)	10 л/100 м <sup>2</sup>	4	-	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие — с интервалом 14 дней.
<b>Картофель</b>	<b>Альтернативоз</b>	0,3–0,5 л/га	200–400 л/га	2	5	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее — с интервалом 10–14 дней.
<b>Морковь</b>	<b>Альтернативоз</b>	0,3–0,5 л/га	200–400 л/га	2	10	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее — с интервалом 10–14 дней.
<b>Роза</b>	<b>Мучнистая роса</b>	2 мл/10 л воды (для ЛПХ)	10 л/100 м <sup>2</sup> (до 1 л/растение)	2	-	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие — с интервалом 14 дней.
	<b>Черная пятнистость</b>	5 мл/10 л воды (для ЛПХ)	10 л/100 м <sup>2</sup> (до 1 л/растение)	4	-	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующие — с интервалом 14 дней.

<b>Томат открытого грунта</b>	<b>Альтернатива</b>	0,3– 0,5 л/га	200– 400 л/г а	2	7	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни, последующее — с интервалом 10–14 дней.
<b>Цветочные растения</b>	<b>Мучнистая роса</b>	2 мл/10 л воды (для ЛПХ)	10 л/100 м <sup>2</sup>	2	-	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующее — с интервалом 14 дней.
	<b>Серая гниль</b>	4 мл/10 л воды (для ЛПХ)	10 л/100 м <sup>2</sup>	2	-	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующее — с интервалом 14 дней.